

Une nouvelle *Acidalia* [LÉP.]

par L. BALESTRE.

Acidalia euphorbiata, nov. sp. — Envergure : 20 mill. environ. — ♂. Ailes d'un jaune terreux, parsemées de quelques atomes noirs. Les supérieures traversées par deux lignes noires : l'extrabasilaire, plus noire à la côte, forme un coude arrondi vers le point cellulaire à peine marqué; la coudée, plus noire à la côte et au bord interne, fait un coude aigu vers le bord externe à hauteur du point cellulaire, subterminale à peine marquée par une ombre légère.

Les inférieures avec deux lignes onduleuses qui sont la continuation de celles des supérieures, l'ombre de la subterminale et un point cellulaire bien marqué. Frange plus claire que le fond, précédée d'une série de petits points noirs.

Dessous d'un jaune pâle luisant, fortement chargé d'atomes noirs, avec la ligne coudée seule visible, mieux marquée en noir qu'au-dessus. Points cellulaires à peine visibles.

♀. Semblable.

Environs de Nice. M^e-Pacanaglia.

Chenille courte, atténuée antérieurement, rugueuse, carénée, uniformément noire. Elle vit sur l'*Euphorbia spinosa*, passe l'hiver et se chrysalide en mai. Éclosion en juillet.

L'*Acidalia euphorbiata* sera figurée sous ses diverses formes.

Description d'une espèce et d'une variété nouvelles de Forficules de Russie [ORTII.]

par J. AZAM.

Labidura riparia Pall., var. **Dumonti**, nov. — Differt a forma typica : colore fusco-castaneo; elytris longioribus et latioribus, alarum parte prominula elongata, testacea, gutta maxima fusco-castanea; abdomine concolore; forcipe ♂ intus post medium dentata.

Cette variété diffère du type : par sa couleur châtain foncé; par ses élytres plus longs et plus larges, de la couleur du corps, avec les bords internes quelquefois châtain clair; par ses ailes bien saillantes, recouvrant parfois le quatrième segment de l'abdomen, testacées, avec une

grande tache ovulaire, irrégulière, de la couleur du corps, atteignant presque les bords antérieur, postérieur et interne (très variable comme largeur, elle arrive parfois à recouvrir presque entièrement la partie saillante de l'aile); par son abdomen de couleur uniforme; et enfin, par la pince ♂ qui a la dent du bord interne des branches placée après le milieu.

	Mâle.	Femelle.
Longueur du corps	18 mill.	14-17 mill.
— du pronotum	2 —	2 —
— des élytres.....	5 —	4-5 —
— de la portion saillante des ailes.	3 —	3 —
— des pinces.....	7-8 —	4-5,5 —
Largeur des élytres.....	7 —	3,5-4 —

Cette variété a été trouvée par M. Mesmin au Caucase, dans le gouvernement d'Elisa-Vethpol, aux environs d'Aresch et Geok-Tapa; vallée de la Koura; elle m'a été communiquée par M. Paul Dumont, membre de notre Société, à qui je me fais un plaisir de la dédier.

Forficula Mesmini, nov. sp. — ♀. *Fusco castaneu*; *caput rufo-testaceum, oculis nigris, antennis testaceis. Pronotum subquadratum, postice valde rotundatum, testaceum. Elytra lutea, elongata, margine postico truncata. Alarum pars prominula dimidio elythro longior, concolor. Segmentum ultimum transversum, medio subimpressum. Luminis subgenitalis rotundata. Forcipis crura, a basi per totam longitudinem continua, apice parum curvata, decussata.* (♂. *Ignotus.*)

♀. Corps brun-châtain foncé. Tête petite, plate, aussi longue que large, châtain clair; yeux petits et noirs. Antennes testacé clair; 1^{er} article épais; 2^e très court; 3^e et 4^e deux fois plus longs que le 2^e; 5^e à 11^e un peu plus longs que les précédents; tous sont plus étroits à la base qu'à l'apex. Pronotum testacé clair, parfois avec une tache brune longitudinale, irrégulière, de chaque côté de l'axe; un peu plus étroit que la tête, presque carré, sauf le bord postérieur semi-circulaire; les bords latéraux sont un peu relevés en gouttière. Élytres plus de deux fois plus longs que le pronotum et d'un tiers plus large, à ponctuation fine, d'un jaune d'œuf, parfois bruns aux bords interne et externe; angles huméraux bien arrondis, tronqués horizontalement au bord postérieur. Ailes dépassant les élytres d'une longueur variable, ayant au moins la moitié de la longueur des élytres, souvent plus, de la couleur des élytres, sans tache. Pattes typiques, testacées. Abdomen brun noir, ponctué, un peu dilaté au milieu, les plis des 2^e et 3^e

segments bien visibles. Dernier segment en forme de trapèze, la grande base étant le bord antérieur, à ponctuation plus forte, plus ou moins imprimé au milieu. Le dessous de la couleur du dos, mais les segments sont un peu moins foncés à la base, couvert de poils courts et clairs; le pénultième segment ventral en demi-cercle. Branches de la pince triquètres à la base, comme striées longitudinalement, grêles ensuite, contiguës sur toute leur longueur, presque droites; les pointes très aiguës sont faiblement courbées à l'apex, testacées, brunes à l'apex. ♂: Inconnu.

Femelle.

Longueur du corps.....	11,5-13	mill.
— du pronotum.....	1,8-2	—
— des élytres.....	3 -4	—
— de la portion saillante des ailes.	1,5-2,3	—
— de la pince.....	2,8-3,5	—
Largeur des élytres.....	2,3-3,5	—

Environs d'Aresch et Geok-Tapa, vallée de la Koura (Caucase); rapportée par M. Mesmin, à qui elle est dédiée.

Une nouvelle espèce de *Etoblattina* [ORTH.]
du houiller supérieur de Fontanes (Gard)

par F. MEUNIER.

L'étude des Blattides primaires des gisements français est à peine ébauchée et toute la littérature concernant ces nomoneures se résume aux courtes remarques de feu Charles Brongniart sur quelques formes du Stéphanien de Commeny, et aux diagnoses de deux espèces nouvelles, *Necymylacris Boulei* et *Etoblattina Gaudryi*, soigneusement étudiées par Agnus, du même gisement stratigraphique. Les autres Blattides paléozoïques européennes décrites par Germar, Geinitz, Goldenberg, Deichmüller, Kusta, Kliver, Westwood et Sterzel, ont été trouvées en Allemagne, en Angleterre et en Autriche.

A ma connaissance, l'élytre signalée ci-dessous diffère, à première vue, des espèces d'Europe et d'Amérique. Elle a quelques traits de ressemblance avec *E. didyma* Germar (d'Allemagne) et aussi avec *E. illustris* du bassin houiller de Pawtucket (États-Unis). -